

Calendario Vaccinale per la Vita

SItI-FIMMG-FIMP

2012

| Vaccino | Ogg-30gg | 3° mese | 5° mese | 7° mese | 11° mese | 13° mese | 15° mese | | 6° anno | 12°-18° anno | 19-49 anni | 50-64 anni | > 64 anni |
|--------------|---------------|------------|---------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|---|------------|-----------|
| DTPa | | DTPa | DTPa | | DTPa | | | | DTPa** | dTpaIPV | 1 dose dTpa*** ogni 10 anni | | |
| IPV | | IPV | IPV | | IPV | | | IPV | | | | | |
| Epatite B | Ep B- EpB* | Ep B | Ep B* | | EpB | | | | | | 3 Dosi Pre Esposizione (0, 1, 6 mesi) - 4 Dosi Post. Esposizione (0, 2, 6 settimane + booster a 1 anno) o Pre Esposizione imminente. (0,1,2,12) | | |
| Hib | | Hib | Hib | | Hib | | | | | | | | |
| MPRV o MPR+V | | | | | | MPRV o MPR+V | | | MPRV o MPR+V | MPR**** o MPR+V^ | 2 dosi MPR**** +V (0-4/8 settimane) | | |
| Pneumococco | | PCV13 | PCV13 | | PCV13 | | PCV13^^ | PCV13/PPV23 (vedi note) | | | PCV13 | | |
| Meningococco | | | | | | Men C§ | | | MenACWYconiugato | | 1dose | | |
| HPV | | | | | | | | | | HPV° | 3 dosi fino a età massima in scheda tecnica | | |
| Influenza | | | | Influenza°° | | | | | 1 dose all'anno | | 1 dose all'anno | | |
| Rotavirus | | Rotavirus# | | | | | | | | | | | |
| Epatite A | | | | | | | | EpA## | | EpA## | 2 dosi (0-6-12 mesi) | | |

 vaccinazione raccomandata per l'età
 vaccinazione raccomandata per l'rischio
 vaccinazione indicata per l'età

IPV = vaccino antipolio inattivato
Ep B = vaccino contro il virus dell'epatite B
Hib = Vaccino contro le infezioni invasive da *Haemophilus influenzae* tipo b
DTPa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare
dTpa = vaccino antidifterite-tetano-pertosse acellulare, formulazione per adulti
MPRV = Vaccino tetravalente per morbillo, parotite, rosolia e varicella
MPR = Vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia
V = Vaccino contro la varicella
PCV13 = Vaccino pneumococcico coniugato tredici valente
MenC = Vaccino contro il meningococco C coniugato
HPV = Vaccino contro i papilloma virus
Influenza = Vaccino trivalente contro l'influenza stagionale
Rotavirus = Vaccino contro i rotavirus
Ep A = vaccino contro il virus dell'epatite A

Note:

*) Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3a

dose che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.

) La terza dose va somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda. La quarta dose, l'ultima della serie primaria, va somministrata nel 5°-6° anno. E' possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpa) **a condizione che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.

***) I successivi richiami vanno eseguiti ogni 10 anni.

****) In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno, oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia di età (*catch-up*) anche una ricerca attiva dei soggetti non vaccinati (*mop-up*).

^) Soggetti anamnesticamente negativi per varicella. Somministrazione di due dosi di vaccino a distanza di ≥ 1 mese l'una dall'altra.

^^) Bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è sufficiente una dose singola. L'offerta di una dose di PCV13 è fortemente raccomandata a bambini mai vaccinati o che abbiano in precedenza completato il ciclo di vaccinazione con PCV7. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi. Anche se non presente nella autorizzazione della immissione in commercio l'utilizzo nella fascia 6 – 50 anni è supportato dalla letteratura (vedi testo)

§) Dose singola. La vaccinazione contro il meningococco C viene eseguita contemporaneamente in due coorti: la prima coorte al 13°-15° mese di vita e la seconda coorte a 12-14 anni. I bambini della prima coorte riceveranno tra il 12° ed il 15° anno una nuova dose di vaccino. Nei soggetti a rischio la vaccinazione contro il meningococco C può iniziare dal terzo mese di vita con tre dosi complessive, di cui l'ultima, comunque, dopo il compimento dell'anno di vita

°) Solo per il sesso femminile. Somministrare tre dosi ai tempi 0, 1, 6 o 0, 2, 6 mesi (in funzione del vaccino utilizzato) . Per accelerare la campagna di copertura in questa fase è auspicabile una strategia multi coorte e comunque il co-payment o social-price per le fasce d'età senza offerta gratuita.

°°) Vaccinare con il vaccino stagionale oltre ai soggetti a rischio previsti dalla Circolare Ministeriale anche i bambini che frequentano stabilmente gli asili o altre comunità. (1)

#) Con almeno offerta in co-pagamento

##) Indicazioni per aree geografiche ad elevata endemia (2 coorti, 15/18 mesi & 12 anni)