

CELOMA

→ vedi anche: [***altri risultati***](#)

Spazio che, nei primi stadi di sviluppo dell'[embrione](#), si forma tra il [corion](#) (copertura esterna dell'embrione) e le due vescicole ([vescicola amniotica](#) e [sacco vitellino](#)) site all'interno di questa cavità. È detto anche *c. extraembrionario* in quanto l'embrione, in questa fase dello sviluppo, è rappresentato dal disco bilaminare corrispondente alla superficie di contatto tra le due vescicole *amniotica* e *vitellina*. In seguito, nella porzione laterale del [mesoderma](#) dell'embrione si sviluppa una cavità (detta *c. intraembrionario*) che comunica col *c. extraembrionale*, dal quale tende poi a isolarsi man [mano](#) che il corpo dell'embrione prende forma e si sviluppa entro la cavità amniotica. La separazione completa si avrà con la chiusura della parete ventrale dell'[addome](#) a livello dell'[ombelico](#). La maggior parte del *c. extraembrionario* si oblitera precocemente in seguito allo sviluppo assunto dalla *vescicola amniotica*, la cui superficie esterna giunge a contatto con la superficie interna del *corion*. Il *c. intraembrionario* invece viene suddiviso da sepimenti membranosi in quattro cavità: le due cavità pleuriche, la cavità pericardica e la cavità peritoneale.